

CUPROFOL

COMPLEJO ACTIVO CUPROAMONIAL

Cuprofol no presenta incompatibilidad con otros agroquímicos, se recomienda agregar Cuprofol en el agua antes que otros productos. Se aconseja la aplicación frente a un brote como lo indica el cuadro.

Cuprofol Max 2 en 1, con suplementos en macro y microelementos brinda una performance para casos extremos. Recordando que una planta bien nutrida, sana y fuerte es más resistente al ataque de las plagas.

La dosis que van en ataque con plaga presente va entre los 6 y 7 litros de Cuprofol por hectárea en cualquiera de sus presentaciones Super plus o Max 2 en 1. Teniendo en cuenta que el agua es sólo un vehículo para llevar el producto a la hoja por lo que no importa la cantidad de agua por hectárea.

En caso de no existir plaga y de realizar esta aplicación en forma preventiva se puede utilizar media dosis de Cuprofol por hectárea (mínimo 3 - 3,5 lts por ha)
La aplicación en todos los casos debe ser entre 7 y 14 días antes de la cosecha.



SUPER PLUS

Mezcla especial líquida

FÓRMULA

Complejo activo cuproamoniacoal _____ 60,5%
Nitrógeno total _____ 1,5 %

Trazas de elementos menores quelatados

Boro - zinc - magnesio - hierro _____ 1,5%
Adhesivo - tensioactivo _____ 3,2 %
Vehículo inerte csp _____ 100%

Ataque temprano - hasta floración.

MAX 2 EN 1

Mezcla especial líquida

FÓRMULA

Complejo activo cuproamoniacoal _____ 60,5%
Nitrógeno total _____ 7%
Potasio soluble (k20) _____ 3%

Elementos menores quelatados

Boro - zinc - magnesio - hierro _____ 2,6%
Adhesivo - tensioactivo _____ 3,5%
Vehículo inerte csp _____ 100%

Los productos utilizados como materia prima poseen la correspondiente aprobación de SENASA.

ATENCIÓN: por ser una fórmula a pedido, recomendamos consultar a un profesional agrónomo sobre el momento, método, dosis de aplicación del producto.

No dejar los envases al alcance de los niños, levemente tóxico e irritante.



CULTIVO	FRENTE A UN BROTE DE	PRODUCTO POR HECTÁREA	MODO DE APLICACIÓN
Olivo	Tuberculosis cercospora	6 - 7 litros	Primera aplicación: post cosecha, y luego de cada granizada o poda. En caso de tuberculosis aplicar sobre los tumores y sobre todo en los cortes, dos aplicaciones a 15 días de intervalo.
Frutales de carozo	Viruela holandesa Torque del durazno	6 - 7 litros	Se recomienda la primera aplicación post cosecha. La segunda aplicación antes de la aparición de los brotes (a yema hinchada)
Vid (consumo en fresco)	Peronóspora	6 - 7 litros	Hasta 15 días antes de la cosecha
Vid (para vinificación)	Peronóspora	6 - 7 litros	Hasta 30 - 45 días antes de la cosecha
Citrus	Antracnosis Sarna o verrugosis Melanosis, Cancrosis Mancha negra	6 - 7 litros	Primera aplicación antes de la aparición de los brotes florales. Segunda aplicación a la caída de los pétalos. Tercera aplicación con la fruta a 2 o 3 cm de diámetro. Cuarta aplicación repetir si fuese necesario entre los 30 y 40 días posteriores.
Nogal	Bacteriosis	6 - 7 litros	Realizar la aplicación en función a la humedad ambiente.
Tomate pimiento papa ajo cebolla	Tizón temprano Tizón tardío Antracnosis	2 - 3 litros	Primera aplicación cuando la planta tenga aproximadamente 15 cm de altura. Segunda aplicación repetir según lo indiquen las condiciones de la planta.
Porotos arveja	Antracnosis Bacteriosis varias	2 - 3 litros	Primera aplicación entre los 15 y 20 días después de nacidos. La segunda antes de la floración. Tercera aplicación post floración. Cuarta aplicación repetir si esto fuese necesario.

Se recomienda hacer el mojado de las hojas en horas de bajo sol para que la gota que queda sobre la hoja no produzca efecto lupa, la queme o la manche.
En las dosis recomendadas no perjudica a abejas ni insectos benéficos.

Lavado: es la pérdida de los productos causado por el agua de la lluvia o irrigación impidiendo que el producto quede adherido a la planta. Por lo tanto se recomienda elegir el día de la aplicación.